


n. pozzo	profondità pozzo	superficie piezometrica	
		soggiacenza	quota assoluta
1	6	5	389
2	8	-	-
3	6	-	-
4	5	2,3	388,2
5	5	2,3	388,2
6	24	19,2	395,8
7	11	6,5	391,5
8	6	3,4	395,6
9	5	5,2	398,8
10	8	-	-
11	19	10,7	393,3
12	25	17,5	395
13	25	18,3	395,2
14	8	5	389,6
15	3,5	-	-
16	-	-	-



LEGENDA

SETTORI SUL VERSANTE

Bacino del T. Gravio: risulta caratterizzato da depositi glaciali costituiti da materiali in prevalenza sciolti, a granulometria variabile con permeabilità media; da substrato roccioso che si ritrova in affioramento soprattutto sulle dorsali e lungo le aste torrentizie o, in subaffioramento, nei settori di testata, e che presenta permeabilità per fessurazione.

Sottobacino del T. Buggia: risulta caratterizzato da accumuli gravitativi costituiti da materiali in prevalenza sciolti, a granulometria variabile, con permeabilità media; da depositi glaciolacustri a granulometria fine, con permeabilità bassa, ed infine dal substrato roccioso in affioramento, che si ritrova soprattutto sulle dorsali e lungo le aste torrentizie o, in subaffioramento, nei settori di testata, e che presenta permeabilità per fessurazione.

Sottobacino del R. Frangerello: risulta caratterizzato da accumuli gravitativi costituiti da materiali in prevalenza sciolti, a granulometria variabile, con permeabilità media; dal substrato roccioso in affioramento, che si ritrova soprattutto sulle dorsali e lungo le aste torrentizie o, in subaffioramento, nei settori di testata, e che presenta permeabilità per fessurazione.

Bacino del R. Chiapinetto: risulta caratterizzato da coltri detritiche costituite da materiali in prevalenza grossolani con alta permeabilità; da coltri recenti, su substrato roccioso prevalentemente subaffiorante, condizionate dalla permeabilità per fessurazione delle rocce sottostanti, come i settori sulle dorsali e lungo le aste torrentizie; da accumuli gravitativi, di modesta estensione, costituiti da materiali in prevalenza sciolti, a granulometria variabile con permeabilità media; ed infine da depositi glaciali costituiti da materiali a granulometria variabile e con permeabilità media.

Bacino del R. Batibò: risulta caratterizzato da coltri detritiche costituite da materiali in prevalenza grossolani con alta permeabilità; da coperture recenti, su substrato roccioso prevalentemente subaffiorante, condizionate dalla permeabilità per fessurazione delle rocce sottostanti, come i settori sulle dorsali e lungo le aste torrentizie; ed infine da accumuli gravitativi, di modesta estensione, costituiti da materiali in prevalenza sciolti, a granulometria variabile, con permeabilità media.

SETTORI SUL FONDOVALE

Depositi fluviali del fondovalle principale: sono caratterizzati da materiali sciolti, prevalentemente ghiaioso-sabbiosi nei settori apicali dei conoidi e sabbioso-limosi nei settori subplaneggianti, con permeabilità che varia da media a medio-bassa o bassa.

Ubicazione dei pozzi con la numerazione progressiva (i dati significativi relativi al censimento dei pozzi sono stati riportati nella tabella in calce)

Isofreatiche

Quote assolute delle linee isofreatiche

Direzione di deflusso

Sorgenti libere e captate

Limite comunale

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

REVISIONE DEL P.R.G.C.

PROGETTO DEFINITIVO

TAV. N.
4

CARTA GEOIDROLOGICA
(DEI PUNTI ACQUA)

Scala 1:10.000

REDAZIONE: PROF. RENATO NERVO
STUDIO GEOLOGICO - Via G. Pomba n°9 - 10123 Torino
Tel./Fax 011.835890 - E-mail: nervo@tscale.it

GENNAIO 2003
Integrazioni: MARZO-OTTOBRE 2004
con il recepimento delle prescrizioni (cfr. parere regionale 16.3.2005)